



Spécial Programme éducatif : La Causerie

Rien de tel qu'une bonne jasette entre enfant et RSG pour bien se comprendre !

Le but premier des causeries est de vivre un moment de complicité si précieux pour nourrir la relation !

Les avantages de faire des causeries régulièrement sont nombreuses.

- C'est un moment d'échange où vous découvrez les opinions personnelles des enfants.
- C'est un bon moment pour partager ce que l'on aime, ou non dans le service de garde.
- C'est un bon moment pour informer les enfants de l'horaire de la journée ou d'un changement à venir.
- On peut trouver, tous ensemble, des solutions à des problèmes comme le rangement, la sieste, les chicanes.
- On peut discuter des règles de fonctionnement. Avec la participation des enfants, vous élaborez des règles qui assurent un fonctionnement agréable, vous déterminez quelles sont les conséquences quand une règle n'est pas respectée.
- Si vous commencez à faire des causeries, vous verrez que le fonctionnement s'améliorera considérablement. Les enfants collaborent davantage car on les a consultés, on les a écoutés, on a pris en considération ce qu'ils ont dit.

- C'est une technique de travail que nous vous encourageons à utiliser. Cela démontre le respect que l'on a pour les enfants et nous agissons ainsi dans l'esprit de l'intervention démocratique.

COLLATION D'ÉTÉ SANTÉ

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ½ T de jus d'orange | 1 cuil. soupe de miel |
| ½ T de jus d'ananas | 1 banane mure tranchée |
| 1 t de lait | 1 cuil. soupe de germe de blé |

Verser tous les ingrédients dans la jarre du mélangeur et liquéfier
Ajoutez des glaçons – Servir froid.

Éveil scientifique chez les tout petits : La glace dans l'huile

1 verre d'huile végétale et 1 cube de glace.
Versez de l'huile dans le verre et déposez-y le cube de glace. Ce dernier flotte. Observez la glace fondre...les petites gouttes d'eau qui se forment tombent au fond du verre ! POURQUOI ? parce que l'huile est moins dense que l'eau mais la glace est moins dense que l'huile.

Pensée : Un enfant a infiniment plus à gagner à faire lui-même une expérience pendant trois jours plutôt que de passer un quart d'heure à voir un adulte lui montrer (Jean Piaget).



GUÊPE OU ABEILLE? ÇA MORD OU ÇA PIQUE?

Si l'on en croit nos grands-mères, la grande activité de ces insectes rayés nous promet un gros hiver!

Quoiqu'il en soit, il faut faire quelques distinctions entre ces deux bestioles! Mais voyons d'abord leurs points communs :

- Toutes deux sont rayées de jaune et de noir et sont de la même grandeur
- Toutes deux vivent en essaim



La guêpe

La guêpe a une taille fine et peu poilu. Elle pique avec beaucoup d'ardeur car son aiguillon n'est pas équipé de harpon elle peut donc piquer à répétition sans perdre la vie, contrairement à l'abeille. Attention si elle se trouve coincée dans un T-shirt! Une application de pâte faite de bicarbonate de soude et d'eau soulagera la douleur.

L'abeille

Elle n'a pas de taille fine. Elle pique et laisse son dard et le réservoir à venin dans la peau et elle meurt ensuite. Le sac de venin sera facilement repérable, il est un peu plus gros qu'une tête d'épingle et il est jaune délavé. Plus vite on le retire, moins il y aura de venin dans la chair et moins douloureuse sera la piqûre.

Le jus d'oignon fraîchement coupé est assez efficace pour soulager la douleur des piqûres d'abeille. Plonger la partie blessée dans du vinaigre pendant 30 minutes permet aussi une très nette diminution de la douleur et du gonflement.

Attention, on ne doit jamais pincer le dard pour le retirer. Cela produirait le même effet que d'appuyer sur le tube de dentifrice...

Deux façons de faire :

- 1- Un léger massage circulaire, sur l'endroit piqué, avec une pincée de sable ou de terre sèche.
- 2- Glisser doucement, une carte plastifiée sur le dard, à un angle de 45 degrés et

dans différentes directions, jusqu'à ce que le dard s'y accroche et ressorte.

EN CAS DE CHOC ALLERGIQUE

Importantes difficultés respiratoires

- 1- Appeler le 9-1-1-
- 2- Administrer l'Épipen

À noter que l'Épipen ne règle pas le choc anaphylactique, elle procure une pause de 15 minutes! Il faut faire l'injection sur la face latérale externe d'une cuisse et maintenir en place pendant 10 secondes. Il y a maintenant de l'Épipen dans les ambulances et les ambulanciers sont autorisés à la donner si nécessaire.

N'oubliez pas de vérifier la date de votre Épipen car c'est un produit périssable!

Sources:

- <http://www.juniorweb.com/sante/securite/abeillesguepes.htm>
- <http://fr.wikipedia.org/wiki/Guêpe>
- <http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille>